Pengaruh Carboxymethyl Cellulose (CMC) dan Gum Arab dalam Velva Buah Naga Super Merah (*Hylocereus costaricensis*)

*Effect of Carboxymethyl Cellulose (CMC) and Gum Arabic in The Velva Super Red Dragon Fruit (*Hylocereus costaricensis*)*

Bara Yudhistira*, Roch Andini Ayu Putri dan Basito

*Program Studi Ilmu Teknologi Pangan Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126 Jawa Tengah Indonesia*

Riwayat Naskah:

Diterima 04 2020
Direvisi 04 2020
Disetujui 04 2020

ABSTRAK: Penggunaan buah naga menjadi produk velva melalui teknologi pembekuan sebagai upaya diversifikasi olahan buah naga. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kombinasi CMC dan gum arab terhadap karakteristik velva buah naga super merah. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu variasi konsentrasi kombinasi bahan penstabil CMC dan gum arab. Rasio *puree* kulit dan daging buah naga super merah yang digunakan adalah 1:4, dengan konsentrasi gula dan asam sitrat yang digunakan adalah 25% dan 0,1%. Berdasarkan hasil analisis sensori diperoleh perbandingan 2:1 sebagai kombinasi CMC dan gum arab terpilih. Pengaruh penggunaan kombinasi bahan penstabil terhadap sampel kontrol (tanpa bahan penstabil) terlihat pada tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur dan *overall*, namun tidak berpengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap warna, rasa dan aroma veva buah naga super merah. Velva buah naga super merah kombinasi CMC dan gum arab 2:1 mempunyai daya leleh 6,41 menit/3 gram, *overrun* 24,07% dan viskositas 2333 cP dan karakteristik kimia seperti total padatan terlarut 28,93 brix dan serat pangan 3,64% yang menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kontrol. Tetapi tidak berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan dan kadar air velva.

Kata kunci: buah naga, CMC, gum arab, penstabil, velva

ABSTRACT: Utilization of dragon fruit into fruit velva product through freezing technology will provide a diversity of processed dragon fruit. The purposes of this study was to determine the effect of the combination of CMC and gum arabic to the velva characteristics of the super red dragon fruit velva . This research applied Completely Randomized Design consist of one factor which is the concentration ratio of the CMC and gum arabic. Puree of pulp and rind super red dragon fruit used were 1:4 with sugar and citric acid concentration 25 and 0,1%. Based on sensory analysis results obtained 2:1 as combination of CMC and gum arabic selected. The using combination of stabilizer to control sample without stabilizers affect the preference level of texture and overall. But didn't affect the preference level of color, taste, and flavor of super red dragon fruit velva. Velva super red dragon fruit combination of CMC and arabic gum 2: 1 have a melting power of 6.41 minutes/ 3 grams, overrun 24.07%, viscosity of 2333 cP, total dissolved solids of 28.93 brix and dietary fiber 3, 64% which shows a higher value than the control. But it does not affect the antioxidant activity and velva water content.

Keywords: dragon fruit, CMC, gum Arabic, stabilizer, velva

* Kontributor utama
Email : barayudhistira@staff.uns.ac.id

1. Pendahuluan

Buah naga adalah salah satu jenis buah yang mulai dikembangkan pada tahun 2000 di Indonesia serta cukup digemari masyarakat karena mempunyai manfaat dan gizi yang cukup tinggi. Buah naga super merah (*Hylocereus costaricensis*) memiliki rasa lebih manis tanpa rasa langu sehingga paling disukai konsumen serta memiliki warna yang menarik (Wahyuni, 2011). Buah naga super merah (*Hylocereus costaricensis*) mengandung antara lain vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, protein, lemak, karbohidrat, serat, flavonoid, tiamin, niasin, piridoksin, kobalamin, glukosa, fenolik, betasianin, polifenol, karoten, fosfor, besi dan fitoalbumin (Jaafar, Rahman, & Vasudevan, 2009).

Sebanyak 30-35% bagian buah naga berupa bagian kulit, sehingga biasanya tidak digunakan. Padahal kulit tersebut masih mengandung beberapa manfaat (Citramukti, 2008). Adapun kandungan kulit tersebut yaitu karbohidrat, lemak, protein dan serat pangan dalam bentuk pektin (Wahyuni 2011), serta mengandung sekitar 46,7% serat pangan (Saneto, 2005) dan memiliki potensi sebagai pewarna alami dan *thickening agent* (Harivaindaram, Rebecca & Candran, 2008).

Inovasi perlu dilakukan untuk mengoptimalkan komponen gizi yang masih terkandung dalam kulit buah naga. Salah satu inovasi yaitu dengan membuat velva dengan kombinasi bahan kulit dan daging buah naga super merah sehingga dihasilkan velva dengan kualitas yang baik berdasarkan mutu sensori. Velva buah yaitu campuran dari beberapa bahan diantaranya *puree* buah, gula, asam sitrat serta penstabil yang kemudian dibekukan untuk mendapatkan tekstur yang halus (Tressler & Evers, 1957).

Permasalahan yang terjadi pada pembuatan velva adalah terbentuknya tekstur velva dengan kristal es yang sangat besar yang dapat mempengaruhi tekstur selama pembekuan, sehingga diperlukan bahan penstabil untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun fungsi bahan penstabil yaitu untuk menunda pembentukan kristal es yang besar, meningkatkan viskositas, serta untuk mendapatkan tekstur yang lembut (Estiasih, 2006).

Pemilihan *Carboxymethyl Cellulose* (CMC) dan gum arab dikarenakan mudah untuk diperoleh, harga cukup murah serta cukup aman digunakan pada jenis pangan olahan (Kumalasari, Ekafitri, & Desnilasari 2015). Sedangkan pemilihan gum arab karena mampu mencegah terbentuknya kristal es dengan ukuran yang lebih besar dengan mekanisme pengikatan sejumlah air, sehingga produk akhir dapat diperbaiki teksturnya. Selain itu, gum arab lebih larut pada pH asam, sedangkan CMC kurang stabil pada pH asam (Hutapea, 2016). CMC stabil pada rentang pH 5-11, optimum pada pH 5, jika

suasana terlalu asam pH kurang dari (< 3) kekentalannya akan menurun (Tranggono & Latifah, 2007). Sedangkan gum arab untuk parameter viskositas dapat mencapai maksimum pH 4,5- 5,5. Apabila gum arab mempunyai pH diluar kisaran tersebut maka viskositas larutan menjadi rendah (Hui, 1992). Kombinasi gum arab dan CMC diharapkan bersinergi untuk menghasilkan kestabilan suspensi yang lebih baik, mengingat pH sari buah naga merah berkisar antara 4,43 – 5,22 (Farikha, Anam & Widowati, 2013).

Pemanfaatan bahan penstabil dalam produk pangan dapat digunakan satu jenis atau kombinasi dari dua jenis bahan penstabil. Sinergi antara penggunaan CMC dan gum arab yaitu dapat memberikan suspensi yang lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan penstabil secara tunggal. Kombinasi CMC dan gum arab menghasilkan velva dengan parameter *overrun* dan resistensi yang lebih meningkat (Noviana, 2003).

Tujuan penelitian ini melihat pengaruh kombinasi perbandingan kulit dengan daging buah naga super merah terhadap karakteristik sensori (warna, rasa, aroma, tekstur, dan overall) *puree* untuk dijadikan velva yang baik menurut analisis sensori, mengetahui pengaruh kombinasi perbandingan CMC dan gum arab terhadap karakteristik sensori meliputi parameter warna, parameter rasa, parameter aroma, parameter tekstur, dan parameter overall dan karakteristik fisik meliputi parameter daya leleh, parameter *overrun*, dan parameter viskositas serta kimia meliputi parameter total padatan terlarut, parameter kadar air, parameter aktivitas antioksidan dan parameter serat pangan pada velva yang terpilih. Diharapkan penggunaan kombinasi bahan baku daging maupun kulit buah naga super merah dengan penstabil CMC dan gum arab dapat menghasilkan velva yang enak untuk dinikmati dan menyehatkan.

2. Bahan dan Metode

2.1. Bahan

Buah naga super merah *grade* super dengan ciri-ciri bobot melebihi 500 gram, kulit berwarna merah cerah dan tanpa cacat. Bahan lainnya adalah gula (sukrosa), CMC, gum arab, dan asam sitrat.

2.2. Alat

Alat-alat yang digunakan antara lain *blender* (Philips, Belanda), *freezer* (Modena, Italia), *Ice Cream Maker* (Gelataio II, Indonesia), timbangan analitik (cis Analytical, Jepang), viskometer (*Brookfield*, Indonesia), inkubator (Spektra, Indonesia), spektrofotometer (Iwaki TE-32, Indonesia), erlenmeyer, gelas ukur, penangas air

(Scilogex, Amerika), destilator (Iwaki Pyrex, Indonesia), oven (Memmert, Indonesia), desikator (Normax, Indonesia), dan *hand refraktometer* (Atago, Jepang).

2.3. Metode

2.3.1. Tahapan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua tahapan yaitu tahap pendahuluan serta dilanjutkan dengan tahapan penelitian utama. Penelitian pendahuluan bertujuan mencari kombinasi *puree* daging dan kulit buah naga super merah pada formula kombinasi yang paling disukai berdasar mutu sensori. Formulasi perbandingan kulit dan daging buah naga yang digunakan antara lain, 5:0, 1:4, 2:3, 3:2, 4:1 dan 0:5 (Wahyuni, 2011). Berdasarkan hasil analisis sensori kepada 30 panelis dengan menggunakan uji hedonik (*scoring*) menunjukkan bahwa kombinasi *puree* kulit dan daging buah terpilih adalah 1:4.

Kombinasi *puree* kulit dengan daging buah naga super merah terpilih selanjutnya akan digunakan pada tahap penelitian utama sebagai formula dalam pembuatan velva buah naga super merah kombinasi CMC dan gum arab. Formulasi CMC dan gum arab yang digunakan adalah 0:1, 1:0, 1:1, 1:2 dan 2:1 (Rini, Ishartani, & Basito, 2012). Analisis yang digunakan dalam tahap penelitian utama adalah mencari formula velva terpilih. berdasarkan analisis sensori. Untuk selanjutnya dianalisis karakteristik fisik dan kimianya.

2.3.2. Analisis sensoris, fisik dan kimia

Analisis sensoris yang dilakukan menggunakan uji hedonik (Soekarto, 1985). Analisis fisik yang digunakan antara lain *overrun* metode (Varnam & Sutherland 1994), viskositas menggunakan alat *Brookfield viscometer*, dan daya leleh metode (Bodyfelt *et al.* 1988). Sedangkan analisis kimia yang

digunakan antara lain kadar air metode Thermovolumetri (AOAC, 1995), kadar serat pangan metode multienzim (AOAC, 1995), total padatan terlarut metode refraktometri (AOAC, 1995), dan aktivitas antioksidan metode DPPH (Yen & Chen 1995).

2.3.3. Rancangan percobaan

RAL (Rancangan Acak Lengkap) digunakan dalam penelitian ini dengan satu faktor, yaitu variasi perbandingan CMC dan gum arab sebagai bahan penstabil. Pada tahap penelitian pendahuluan dan penelitian utama untuk pemilihan sampel terpilih dilakukan dengan analisa sensori dengan menggunakan metode *scoring* dengan melibatkan 30 panelis. Menggunakan 5 skala kesukaan (Kemp, Tracey, & Joanne, 2009). Analisis data dilakukan dengan analisis sidik ragam (*One Way ANOVA*) dan dilakukan uji Duncan pada taraf kepercayaan 5%.

Parameter yang dianalisis adalah karakteristik fisik dan kimia pada velva buah naga super merah terpilih. Karakteristik fisik yang dianalisis antara lain *overrun*, viskositas, dan daya leleh. Sedangkan karakteristik kimianya kadar air, total padatan terlarut, aktivitas antioksidan, dan kadar serat pangan. Analisis *Paired Sample t-Test* pada tingkat $\alpha = 0,05$ digunakan dengan membandingkan 2 sampel yaitu sampel kontrol tanpa bahan penstabil dan sampel velva terpilih.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sifat sensoris velva buah naga super merah

Aspek sensori adalah salah satu karakteristik yang cukup penting untuk melihat penerimaan secara sensoris oleh konsumen terhadap suatu produk.

Tabel 1.

Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Velva Buah Naga Super Merah Berbagai Perlakuan Formulasi

Rasio CMC:gum arab*	Parameter Uji*,**				
	Warna	Rasa	Aroma	Tekstur	Overall
Kontrol	3,83 ^a	3,47 ^a	3,00 ^a	2,90 ^a	3,03 ^a
0:1	4,03 ^a	3,77 ^a	3,17 ^a	3,37 ^b	3,47 ^b
1:0	4,00 ^a	3,67 ^a	3,23 ^a	3,67 ^{bc}	3,57 ^b
1:1	3,97 ^a	3,67 ^a	3,23 ^a	3,77 ^{bc}	3,37 ^{ab}
1:2	4,20 ^a	3,60 ^a	3,13 ^a	3,83 ^{bc}	3,53 ^b
2:1	4,00 ^a	3,87 ^a	3,27 ^a	4,00 ^c	3,60 ^b

Keterangan :

* Data ditandai dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya beda nyata pada tiap perlakuan ($\alpha = 0,05$).

** Skor: 5 = sangat suka, 4 = suka, 3 = netral, 2 = tidak suka, 1 = sangat tidak suka.

3.1.2. Warna

Penerimaan panelis terkait warna velva buah naga berkisar 3,83 – 4,20. Warna velva buah naga yang disukai adalah velva buah naga dengan kombinasi CMC dan gum arab 1:2 dengan skor tertinggi 4,20. Sedangkan skor terendah terdapat pada velva buah naga tanpa penambahan bahan penstabil (kontrol) sebesar 3,83. Hasil analisis menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan terhadap kesukaan panelis terhadap parameter warna, CMC dan gum arab berwarna putih. Penambahan bahan penstabil tidak memberikan pengaruh nyata terhadap velva buah naga, hal ini sesuai dengan Klose & Glicksman (1972) yang menyatakan CMC dan karagenan tidak mempengaruhi bau dan warna.

Gambar 1. Gambar velva buah naga super merah kontrol

3.1.3. Rasa

Kisaran kesukaan panelis terhadap rasa velva buah naga antara 3,47 – 3,87. Skor kesukaan tertinggi terhadap parameter rasa pada velva buah naga terdapat pada velva dengan kombinasi CMC dan gum arab sebesar 2:1. Dari skor kesukaan panelis terhadap rasa velva cenderung memilih rasa netral menuju suka. Sedangkan skor terendah dimiliki oleh sampel kontrol tanpa penambahan bahan penstabil dengan nilai 3,47. Berdasarkan pada Tabel 1. diketahui bahwa variasi kombinasi bahan penstabil pada velva buah naga berdasarkan tingkat kesukaan panelis menunjukkan hasil tidak berbeda nyata terhadap parameter rasa. CMC dan gum arab termasuk dalam hidrokoloid yang tidak mempunyai rasa. Sehingga variasi kombinasi penggunaan kedua bahan penstabil ini pada velva buah naga super merah tidak mempengaruhi rasa produk. Penggunaan CMC dan gum arab yang berbeda dengan produk velva wortel tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap kesukaan panelis, hal tersebut dikarenakan CMC dan gum arab merupakan hidrokoloid yang tidak mempunyai rasa (Rini et al., 2012). Penambahan bahan penstabil tidak berpengaruh nyata terhadap

rasa velva dikarenakan kulit dan buah naga mempunyai rasa yang khas (Elastri, 2015).

3.1.4. Aroma

Nilai penerimaan panelis berkisar pada 3,00 – 3,27 serta nilai tertinggi dimiliki oleh velva dengan kombinasi CMC dan gum arab 2:1 sebesar 3,27 sedangkan nilai terendah dimiliki oleh velva tanpa penambahan bahan penstabil (kontrol) dengan nilai 3,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan variasi kombinasi CMC dan gum arab tidak mempengaruhi kesukaan panelis terhadap aroma velva buah naga. Hasil identifikasi senyawa aroma buah naga merah dengan menggunakan GC-MS menunjukkan senyawa aroma sebagian besar dari senyawa yang merupakan kelompok alkohol, asam karboksilat, alkana, keton, aldehida, terpenoid, alkena, dan ester (Puspita, 2011).

Perbedaan pada jenis serta konsentrasi dari bahan penstabil tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada atribut aroma (Yahdiyani, Anam, & Widiowati, 2015). Penambahan stabilizer CMC dan gum arab pada velva sirsak tidak berpengaruh terhadap karakteristik warna dan aroma (Parnanto, Yudhistira, & Pertiwi, 2018). Velva buah tomat dengan penambahan madu, aroma tidak berbeda nyata pada konsentrasi madu 15%, 25%, dan 35%, hal ini karena aroma tomat mendominasi aroma velva (Sapriyanti, Hurhartadi, & Ishartani, 2014).

3.1.5. Tekstur

Tingkat penerimaan panelis terhadap tekstur velva buah naga super merah berkisar antara 2,90 – 4,00. Nilai tertinggi dimiliki oleh velva dengan kombinasi CMC dan gum arab 2:1, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh velva tanpa penambahan bahan penstabil (kontrol). Velva tanpa penggunaan bahan penstabil menghasilkan tekstur kurang baik hal ini ditandai dengan pembentukan kristal es yang banyak dan besar sehingga velva mudah meleleh. Pada Tabel 1 terlihat bahwa penggunaan variasi kombinasi bahan penstabil menunjukkan beda nyata pada sampel kontrol dengan keempat sampel lain yang menggunakan bahan penstabil. Namun tidak terdapat beda nyata antara sampel CMC saja dengan perbandingan CMC dan gum arab 1:1 ; 1:2 ; dan sampel terpilih 2:1.

Kombinasi CMC dan gum arab dengan rasio 2:1 merupakan formula dengan tingkat kesukaan panelis yang paling tinggi yaitu memiliki kelembutan pada tekstur yang paling tinggi serta dengan kristal es yang dihasilkan cukup lembut (kecil). Bahan penstabil dapat membentuk tekstur yang lembut dengan kemampuan dalam membentuk ikatan dengan air pada campuran adonan (Arbuckle &

Marshall, 1996). Penambahan bahan penstabil meningkatkan nilai tekstur, seperti dalam penelitian Penambahan CMC pada sorbet sari buah meningkatkan nilai tekstur dan kekentalan adonan (Puteri, Nainggola, & Limbong, 2015).

CMC memiliki kelebihan selain dapat mengikat dan mudah larut pada adonan es krim, serta tekstur yang halus dapat dibantu untuk dipertahankan (Arbuckle & Marshall, 1996). Peningkatan CMC akan membentuk ikatan silang yang makin besar serta terjadinya peningkatan immobilisasi molekul pelarut sehingga viskositas cenderung meningkat (Kamal, 2010). Peningkatan kekentalan, menyebabkan peningkatan air yang terikat, sehingga pembentukan kristal es yang kasar dapat dicegah dan tekstur menjadi lembut.

Sifat karagenan dapat membentuk ikatan dengan air yang mempunyai kapasitas yang cukup besar sehingga menjadikan produk tersebut tidak cepat kering pada udara dan kelembaban yang rendah, selain itu harganya relatif murah (Winarno, 1990).

3.1.6 Overall

Rata-rata penilaian panelis terhadap sensori velva buah naga super merah secara keseluruhan (*overall*) dengan kisaran 3,03-3,60. Penerimaan panelis secara keseluruhan yaitu pada kombinasi CMC dan gum arab 2 : 1 yaitu 3,60. Sedangkan tingkat kesukaan pada parameter *overall* velva buah naga super merah terendah yaitu pada velva tanpa bahan penstabil (kontrol) sebesar 3,03. Pada Tabel 1. menunjukkan penambahan kombinasi CMC dan gum arab terlihat perbedaan nyata pada parameter keseluruhan velva buah naga super merah berdasarkan penilaian panelis pada mutu sensori. Berdasarkan hasil penelitian. Penambahan kombinasi CMC dan karagenan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada parameter warna, rasa dan aroma akan tetapi berpengaruh nyata pada tekstur dan *overall* (Basito, Yudhistira, & Meriza, 2018). Sedangkan penelitian) pada velva jambu biji merah probiotik perlakuan terbaik parameter organoleptik yaitu penggunaan konsentrasi CMC 1% dan sukrosa 30% (Maria & Zubaidah, 2014). Sedangkan velva dengan bahan baku bubur buah naga merah dan bubur kelopak rosella formulasi terbaik yaitu 3:1 (Damanik, Efendi, & Setiaries, 2018).

3.2. Sifat Fisik Velva Buah Naga Super Merah Terpilih

3.2.1. Overrun

Overrun adalah penambahan volume velva pada saat proses pembekuan yang disebabkan pengikatan udara dalam proses pembuihan dan pembekuan.

Penghitungan *overrun* dilakukan dengan perbedaan antara volume velva dan adonan dengan berat yang sama atau dapat juga dilakukan berdasarkan perbedaan berat velva dan berat adonan pada volume yang sama (Arbuckle & Marshall, 1996). Pada penelitian ini *overrun* dihitung berdasarkan perbandingan berat velva dengan berat adonan pada volume yang sama. Volume yang digunakan adalah 50 ml.

Gambar 2. Grafik *overrun* velva buah naga super merah dibandingkan dengan kontrol

Analisis statistik dengan menggunakan T-test pada velva terpilih kombinasi CMC dan gum arab 2 :1 dengan produk kontrol (tanpa bahan penstabil) menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi bahan penstabil berpengaruh yang nyata terhadap *overrun* velva buah naga super merah pada $\alpha = 0,05$. Gambar 2. menunjukkan bahwa nilai *overrun* velva yang terpilih memiliki *overrun* yang lebih tinggi daripada velva kontrol. *Overrun* velva buah naga super merah sebesar 24,07 % sedangkan velva kontrol 16,96%. *Overrun sherbet* sebesar 30 - 40% (Arbuckle & Marshall 1996). Hal ini terjadi karena velva mengandung serat yang lebih tinggi dibandingkan *sherbet*. Penggunaan *puree* buah menyebabkan nilai serat pada velva lebih tinggi dibandingkan *sherbet*. Rendahnya nilai *overrun* dipengaruhi oleh kandungan serat dalam adonan. Semakin tinggi kadar serat semakin rendah nilai *overrun*-nya. Serat pangan mempunyai manfaat yaitu mengendalikan berat badan, mengatasi penyakit diabetes, mencegah masalah pada saluran pencernaan, kanker kolon dan dapat meminimalkan kolesterol dalam darah (Santoso, 2011). Penambahan berbagai konsentrasi CMC dan gum arab berpengaruh signifikan terhadap parameter *overrun* pada velva buah nangka (Yudhistira, Riyadi, & Pangestika, 2018).

3.2.2. Viskositas

Viskositas (kekentalan) menunjukkan ketahanan aliran cairan, satuannya adalah poise. Nilai viskositas velva buah naga super merah sebesar 2333 cP. Analisis statistik dengan T-test velva

terpilih yaitu kontrol yang menunjukkan penggunaan kombinasi bahan penstabil berpengaruh nyata terhadap viskositas velva pada $\alpha = 0,05$. Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai viskositas velva dengan kombinasi CMC dan gum arab dengan nilai yang lebih tinggi daripada velva kontrol tanpa bahan penstabil. Nilai viskositas velva buah naga super merah sebesar 2333 cP sedangkan velva kontrol 1975 cP. Hal ini terjadi karena pada velva kontrol tidak terdapat bahan penstabil yang berfungsi untuk meningkatkan kekentalan adonan.

Gambar 3. Grafik viskositas velva buah naga super merah dibandingkan dengan kontrol

CMC yang terdapat pada larutan memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan silang pada molekul polimer sehingga molekul pelarut akan terjebak didalamnya dan immobilisasi molekul pelarut kemudian membentuk struktur molekul yang kaku dan tahan terhadap tekanan. Jumlah CMC yang banyak, akan membentuk ikatan silang yang semakin besar dan immobilisasi molekul pelarut juga makin tinggi sehingga viskositas cenderung meningkat (Kamal, 2010).

3.2.3. Daya leleh

Daya leleh merupakan waktu yang diperlukan velva atau es krim untuk meleleh secara sempurna pada suhu ruang. Resistensi yang tinggi terhadap pelelehan menunjukkan produk mempunyai kualitas yang baik (Arbuckle & Marshall, 1996).

Gambar 4. Grafik daya leleh velva buah naga super merah dibandingkan dengan kontrol

Analisis statistik dengan menggunakan T-test yang dilakukan pada velva buah naga super merah terpilih dengan velva kontrol menunjukan penggunaan bahan penstabil memberikan pengaruh yang nyata pada parameter daya leleh velva pada $\alpha = 0,05$. Gambar 3. menunjukkan bahwa nilai daya leleh velva kombinasi CMC dan gum arab memiliki nilai yang lebih tinggi daripada velva kontrol tanpa bahan penstabil.

Daya leleh velva buah naga super merah sebesar 6,41 menit/3g velva. Sedangkan, nilai daya leleh velva kontrol adalah 4,79 menit/3 g velva. Kombinasi bahan penstabil CMC dan gum arab dapat mengoptimalkan daya pengikatan air yang menyebabkan viskositas adonan meningkat serta daya leleh menjadi semakin lambat (Setianawati, 2002). Daya leleh pada velva jambu biji merah acuan berkisar antara 2,29-4,33 menit (Maria & Zubaidah, 2014) dan velva nenas acuan berkisar antara 6,16-8,03 menit (Kesuma, 2011).

3.3. Sifat kimia velva buah naga super merah terpilih

3.3.1. Total padatan terlarut

Total padatan merupakan keseluruhan komponen padatan terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat pada suatu bahan pangan. Total padatan berfungsi untuk menurunkan titik beku, pembentukan rasa, serta untuk meningkatkan viskositas adonan pada velva. Selain itu berguna dalam mencegah terjadinya penggumpalan terhadap parameter tekstur dan menjaga gelembung udara agar mempunyai ukuran yang kecil dan stabil pada es krim atau velva (Nugroho & Kusnadi, 2015).

Gambar 5. Grafik total padatan terlarut velva buah naga super merah dibandingkan dengan kontrol

Analisis statistik dengan menggunakan T-test menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi bahan penstabil memberikan pengaruh yang nyata pada parameter total padatan terlarut velva buah naga super merah pada $\alpha = 0,05$. Gambar 5 menunjukkan total padatan terlarut velva kombinasi CMC dan gum arab memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu sebesar

28,93 °Brix dibandingkan dengan velva kontrol tanpa bahan penstabil yang memiliki padatan terlarut sebesar 27,87 °Brix. Hal ini terjadi, karena tanpa penambahan bahan penstabil menyebabkan jumlah padatan yang terkandung dalam velva kontrol tersebut berkurang. Pengaruh total padatan terlarut yang tinggi sehingga dapat meningkatkan air bebas yang terikat. Banyak jumlah partikel yang diikat oleh komponen bahan penstabil menyebabkan peningkatan total padatan terlarut (Farikha et al., 2013). Total padatan terlarut velva buah naga super merah pada sampel kontrol tanpa bahan penstabil mempunyai nilai yang lebih rendah daripada velva yang menggunakan CMC dan karagenan dengan bahan buah naga super merah. Penggunaan konsentrasi bahan penstabil CMC dan karagenan dapat menyebabkan peningkatan pada parameter total padatan terlarut (Basito et al., 2018).

3.3.2. Kadar air

Hasil Analisa data menunjukkan penggunaan kombinasi bahan penstabil tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air velva pada $\alpha = 0,05$. Kadar air velva buah naga super merah dengan kombinasi CMC dan gum arab (Gambar 6) memiliki nilai yang tidak signifikan dibandingkan dengan velva kontrol tanpa bahan penstabil. Kadar air velva buah naga super merah sebesar 57,25%, sedangkan kadar air velva kontrol sebesar 57,43%.

Gambar 6. Grafik kadar air velva buah naga super merah dibandingkan dengan kontrol

Air dalam velva berasal dari kadar air daging buah naga yang itu sendiri. Proporsi daging buah yang digunakan pada kedua sampel perlakuan adalah sama, sehingga kadar air yang terkandung dalam velva pun tidak jauh berbeda diantara kedua perlakuan. Velva kontrol memiliki kadar air yang lebih tinggi karena tidak terdapat bahan penstabil yang dapat mengikat air.

CMC merupakan bahan penstabil yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ikatan

dengan gula, air, asam-asam organik serta komponen yang lain yang menyebabkan ikatan lebih stabil. Komponen air, gula, asam-asam organik dan komponen-komponen yang terikat dengan baik menyebabkan peningkatan padatan terlarut (Sulastri, 2008). Kadar air velva buah naga super merah pada sampel kontrol tanpa bahan penstabil lebih besar jika dibandingkan dengan velva buah naga super merah yang menggunakan bahan penstabil CMC dan karagenan (Basito, Yudhistira, & Meriza, 2018).

3.3.3. Aktivitas antioksidan

Persentase kemampuan suatu bahan pangan atau makanan dalam menghambat adanya radikal bebas disebut sebagai aktivitas antioksidan (Pratiwi, 2015).

Gambar 7. Grafik aktivitas antioksidan velva buah naga super merah dibandingkan dengan kontrol

Analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi bahan penstabil tidak berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan velva pada $\alpha = 0,05$. Gambar 6 menjelaskan bahwa aktivitas antioksidan velva kombinasi CMC dan gum arab memiliki nilai yang tidak signifikan. Nilai aktivitas antioksidan velva buah naga sebesar 65,24%. Sedangkan aktivitas antioksidan pada velva kontrol sebesar 65,19%. Kandungan zat bioaktif dalam bentuk antioksidan dibentuk oleh asam askorbat, betakaroten dan antosianin (Pratomo, 2008).

Prosentase aktivitas antioksidan dipengaruhi nilai kandungan antioksidan bahan dan proses pengolahan dipengaruhi juga oleh sifat bahan penstabil. Sifat bahan penstabil gum arab yang merupakan salah satu bahan penstabil yang dikombinasikan dengan CMC memiliki sifat yang membentuk film dan tekstur, dapat membentuk ikatan dan emulsi yang baik dan gum arab dapat mempertahankan material inti pada produk (Thevenet, 1998). Gum arab dapat membentuk lapisan gel sehingga material inti dapat terlindungi. Proses pembuatan es krim dapat mencegah kerusakan antioksidan hal ini disebabkan karena

dalam proses tersebut tidak menggunakan suhu yang tinggi (Waladi, Vonny, & Hamzah, 2015).

3.3.4. Serat pangan

Serat pangan merupakan golongan polisakarida dan polimer – polimer lain yang dalam sistem *gastrointestinal* tidak dapat dicerna pada bagian atas tubuh manusia (Muchtadi, 2000). Serat pangan digolongkan dalam dua golongan yaitu serat pangan larut (*soluble dietary fiber*) dan serat tidak larut (*insoluble dietary fiber*). Adapun serat pangan larut yaitu pektin dan gum. Sedangkan serat tidak larut yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin, yang banyak ditemukan pada sereal, kacang-kacangan dan sayuran (Santoso, 2011). Pada buah naga serat pangan berupa pektin (Pratomo, 2008).

Gambar 8. Grafik serat pangan velva buah naga super merah dibandingkan dengan kontrol

Analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi bahan penstabil memberikan pengaruh yang nyata terhadap serat pangan velva pada $\alpha = 0,05$. Gambar 8 menunjukkan nilai serat pangan velva dengan kombinasi CMC dan gum arab memiliki nilai yang lebih tinggi daripada velva kontrol tanpa bahan penstabil. Serat pangan velva buah naga super merah sebesar 3,63 sedangkan pada velva kontrol sebesar 3,38. Hal ini terjadi karena adanya penambahan CMC akan meningkatkan kadar serat (Nisa & Putri, 2014).

Muchtadi (2001), terdapat dua jenis golongan serat pangan yaitu serat larut dan serat tidak larut. Gum arab merupakan golongan serat pangan larut (SDF). Sehingga peningkatan kandungan serat pangan pada velva disebabkan oleh penambahan bahan penstabil.

4. Kesimpulan

Kombinasi *puree* kulit dan daging buah naga super merah mempengaruhi kesukaan panelis. Melalui uji kesukaan (hedonik) secara keseluruhan, menunjukkan bahwa tingkat penerimaan yang paling

tinggi yaitu pada kombinasi *puree* kulit dan daging buah naga yaitu 1:4.

Pengaruh kombinasi penstabil terhadap karakteristik fisik velva kontrol (tanpa penambahan bahan penstabil) dengan velva yang ditambahkan kombinasi penstabil CMC dan gum arab (2:1) menunjukkan perbedaan nyata terhadap, *overrun* 24,07%, viskositas 2333 cP, dan daya leleh 6,41 menit/3 gram, dimana velva dengan kombinasi penstabil menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibanding velva kontrol.

Ucapan Terima Kasih

Kepada seluruh tim yang tergabung dalam penelitian velva buah naga, kami mengucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- AOAC. (1995). *Official Method Of Analysis*. Arlington, Inc. New York
- Arbuckle, W.S & Marshall, R.T.(1996). *Ice Cream* 5th edition. New York: Chapman and Hall.
- Basito, Yudhistira, B., Meriza, DA. (2018). Kajian Penggunaan Bahan Penstabil Cmc (Carboxil Methyl Cellulosa) Dan Karagenan Dalam Pembuatan Velva Buah Naga Super Merah (*Hylocereus Costaricensis*). *Jurnal Teknologi Dan Industri Pertanian Indonesia* . Vol 10 (1) 42-49.
- Bodyfelt, F. W., J. Tobias & G. Trout. (1988). *The Sensory Evaluation of Dairy Product*. AVI Publishing Company, Westport, Connecticut.
- Citramukti, I. (2008). *Ekstraksi dan Uji Antosianin pada Kulit Buah Naga (Hylocereus costaricensis)*. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Damanik, AD., Efendi R., & Setiaries, V. (2018). *Pemanfaatan Buah Naga Merah Dan Kelopak Rosella Dalam Pembuatan Velva*. *Jom Ur* Vol 5 (2). 1-15
- Elastri, A. (2015). *Pengaruh Substitusi Ekstrak Kulit Buah Naga Merah terhadap Kualitas Es Krim*. Jurusan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.
- Estiasih, T. (2006). *Teknologi dan Aplikasi Polisakarida dalam Pengolahan Pangan*. Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang
- Farikha, IN., Anam, C., & Widowati, E. (2013) Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Bahan Penstabil Alami Terhadap Karakteristik Fisikokimia Sari Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*) Selama Penyimpanan. *Jurnal Teknosains Pangan*. Vol 2 (1) 30-38.
- Harivaindaran, K.V., O.P.S. Rebecca & S. Chandran. (2008). Study of Optimal Temperature, pH and Stability of Dragon Fruit (*Hylocereus polyrhizus*)

- Peel for Use as Potential Natural Colorant. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 11: 2259-2263.
- Hui, Y. H. (1992). *Encyclopedia of Food Science and Technology*. John Wiley and Sons. Toronto.
- Hutapea, C.A., Rusmarilin, H., & Nurminah, M. (2016). Pengaruh perbandingan zat penstabil dan konsentrasi kuning telur terhadap (reduced fat mayonnaise). *Jurnal Rekayasa Pangan dan Pertanian*, 4(3), 1-8.
- Jaafar, R.A., Rahman, A. R. B. A.; N. Z. C., & Vasudevan, R. (2009). Proximate Analysis of Dragon Fruit (*Hylocereus Polyhizrus*). *American Journal of Applied Sciences* 6 (7): 1341-1346.
- Kamal, N. (2010). Pengaruh Bahan Aditif CMC (Carboxyl Methyl Cellulose) terhadap Beberapa Parameter pada Larutan Sukrosa. *Jurnal Teknologi* (1)17: 78:84.
- Kemp S E, Tracey H & Joanne H. (2009). *Sensory Evaluation a Practical Handbook*. Singapore: Macmillan Publishing Solutions Singapore.
- Kesuma, Tiara. I. (2011). *Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Pati terhadap Karakteristik Tepung Nanas (Ananas comocus (L) Merr) dan Pengaruh CMC terhadap Karakteristik Velva Berbahan Dasar Tepung Nanas*. Teknologi Pertanian, IPB. Bogor.
- Klose R. E & Glicksman M. (1972). *Gums. Hand Book of Food Addictive*. Edisi Kedua. CRC Press Inc. Ohio.
- Kumalasari, R., Ekafitri, R., & Desnilasari, D. (2015). Pengaruh bahan penstabil dan perbandingan bubur buah terhadap mutu sari buah campuran pepaya-nanas. *Jurnal Hortikultura*, 25(3), 266-276.
- Maria, N. Devrina dan Zubaidah, E. (2014) Pembuatan Velva Jambu Biji Merah Probiotik (*Lactobacillus acidophilus*) Kajian Presentase Penambahan Sukrosa dan CMC. *Jurnal Pangan dan Agroindustri* Vol. 2 No 4.
- Muchtadi, D. (2000). *Sayur-sayuran Sumber Serat dan Antioksidan:Mencegah Penyakit Degeneratif*. Bogor: IPB.
- Muchtadi, D. (2001). Sayuran Sebagai Sumber Serat Pangan Untuk Mencegah Timbulnya Penyakit Degeneratif. *Jurnal Teknologi Indwiri Pangan*, Vol. XU, No.1 lk 2001 .
- Nisa, D., Putri, W.D.R. (2014). Pemanfaatan Selulosa Dari Kulit Buah Kakao (*Theobroma cacao L.*) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Cmc (Carboxymethyl Cellulose). *Jurnal Pangan dan Agroindustri*. Vol 2 No 3.
- Noviana. (2003). *Pengaruh Rasio Kemang, Air, dan Gula serta Kombinasi CMC-Gum Arab terhadap Mutu Fisikokimia dan Organoleptik Velva Kemang (Mangifera caesia)*. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Nugroho, Y.A., & Kusnadi, J. (2015). Aplikasi Kulit Manggis (*Garcinia mangostana L.*) sebagai Sumber Antioksidan pada Es Krim. *Jurnal Pangan dan Agroindustri* Vol. 3 No. 4 p.1263-1271.
- Parnanto, NHR., Yudhistira, B., S R Pertiwi, SR., Pangestika, A. (2018). The effect of CMC and arabic gum stabilizer combination on the characteristics of soursop velva (*Annona muricata L .*). *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 142.
- Prasetyowati, DA., Nursiwi, A., dan Widowati, E. (2014). Pengaruh Penambahan Gum Arab Terhadap Karakteristik Fisikokimia dan Sensoris Fruit Leather Nanas (*Ananas comosus L. Merr.*). *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, Vol. 15 No. 2
- Pratiwi, R.U. (2015). *Kadar Fenol Total, Aktivitas Antioksidan dan Tingkat Kesukaan Minuman Fungsional Jelly Yogurt Srikaya dengan Penambahan Karagenan*. Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pratomo. (2008). *Superioritas Jambu Biji dan Buah Naga* (online). Diakses 12 Agustus 2011 dari <http://unika.ac.id/pasca/pmpt/?p=5>
- Puspita, VA. (2011). *Karakterisasi Flavor Buah Naga Putih (Hylocereus undatus) dan Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus)*. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Puteri, F. Nainggolan, RJ., Limbong, LN. (2015). Pengaruh Konsentrasi CMC (*Carboxy Methyl Cellulose*) Dan Lama, Penyimpanan Terhadap Mutu Sorbet Sari Buah. *Jurnal Rekayasa Pangan dan Pertanian*., Vol.3 (4). 465-470
- Rini, K.A., Ishartani D., Basito. (2012). Pengaruh Kombinasi Bahan Penstabil CMC dan Gum Arab Terhadap Mutu Velva Wortel (*Daucus Carota L.*) Varietas Selo Dan Varietas Tawangmangu. *Jurnal Teknosains Pangan*. Vol. 1 (1) 86-94.
- Saneto, B. (2005). Karakterisasi kulit buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*). *Jurnal Agarika*. Vol 2: 143-149.
- Santoso, A. (2011). Serat pangan (Dietary fiber) dan manfaatnya bagi kesehatan. *Jurnal Magistra*. Vol 2: 35-40.
- Sapriyanti, R., Nurhartadi, E., Ishartani, D. (2014). Karakteristik Fisikokimia Dan Sensori Velva Tomat (*Lycopersicum esculentum Mill*) Dengan Pemanis Madu. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, Vol. 7, No. 1. 59-69
- Setianawati, Hijrah Nora. (2002). *Penggunaan Kombinasi Bahan Penstabil pada Pembuatan Velva Kweni (Mangifera odorata Griff.)*. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor
- Soekarto. S. T. 1985. *Penilaian Organoleptik untuk Industri Pangan dan Hasil Pertanian*. Bhratara Karya Aksara. Jakarta

- Sulastri. (2008). Pengaruh Jumlah Santan dan Lama Penyimpanan Beku Terhadap Viabilitas *Lactobacillus acidophilus* dalam Es Krim Nabati Probiotik. *Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi*. Vol. 6 No. 2: 10-11.
- Thevenet, F. (1988). *Acacia gums stabilizers for flavor encapsulation*. American Chemical Society. 37: 44.
- Tranggono, IR & Latifah, (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetika*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tressler, D. K & Evers. (1957). *The Freezing Preservation of Food*. (Third Edition Westport. Connecticut. Te AVI Publishing Company.
- Varnam, H & Sutherland, P. (1994). *Milk and Milk Product. Technology, Chemistry, and Microbiology*. Chapman and Hall. London.
- Wahyuni, R. (2011). Pemanfaatan Kulit Buah Naga Super Merah (*Hylocereus costaricensis*.) sebagai Sumber Antioksidan dan Pewarna Alami pada Pembuatan Jelly. *Jurnal Teknologi Pangan*. Vol 2: 68-85.
- Wahyuni, R. (2012). Pemanfaatan Buah Naga Super Merah (*Hylocereus costaricensis*) dalam Pembuatan Jenang dengan Perlakuan Penambahan Daging Buah yang Berbeda. *Jurnal Teknologi Pangan*, Vol. 4 No. 1.
- Waladi., J, Vonny, S., & Hamzah, F. (2015) Pemanfaatan Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*.) sebagai Bahan Tambahan dalam Pembuatan Es Krim. *Jom Faperta* Vol. 2 No.1.
- Winarno, F. G. (1990). *Teknologi Pengolahan Rumput Laut*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Yahdiani, H., Chairul., A & Widiowati, E. (2015). Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil terhadap Karakteristik Fisko kimia dan Organoleptik Chili Cream Cheese. *Jurnal Teknologi Pangan* Vol 4(2): 4.
- Yen, G.C & Chen, H.Y. (1995). Antioxidant Activity of Various Tea Extract in Relation to Their Antimutagenicity. *J. Agri. Food. Chem.* 27-32.
- Yudhistira, B., Riyadi, NH., Pangestika AD., Pertiwi SR. (2018) Effect of CMC and arabic gum in the manufacture of jackfruit velva (*Artocarpus heterophyllus*). *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 142